



FOLTRON® PLUS
FERTILIZANTE FOLIAR

FICHA TECNICA

INFORMACIÓN GENERAL	
INGREDIENTE ACTIVO	Folcisteina, Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Hierro, Zinc, Magnesio, Manganeso, Boro, Cobre, Molibdeno, Sustancias húmicas, Agua.
NOMBRE QUÍMICO	Folcisteina, N, P ₂ O ₅ , K ₂ O, Fe, Zn, Mg, Mn, B, Cu, Mo, Sustancias húmicas, Agua.
GRUPO QUÍMICO	Macro y micronutrientes, bioestimulantes, elementos acompañantes y sustancias húmicas
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Folcisteína (0,275%), Nitrógeno (6,0 %), Fósforo (20,0 %), Potasio (5,0 %), Fe (0,05%), Zn (0,05%), Mg (0,01%), Mn (0,01%), B (0,008%), Cu (0,005%), Mo (0,0002%), Sustancias húmicas (0,626%), Agua (56,55%).
MODO DE ACCIÓN	Bioestimulante
FABRICANTE/FORMULADOR	Grupo Bioquímico Mexicano S.A. de C. V, México.
TOXICIDAD	Producto de baja toxicidad para humanos y animales
ANTÍDOTO	No tiene antídoto específico. Tratamiento base.
AUTORIZACIÓN SAG N°	No corresponde por la naturaleza del producto.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
<p>FOLTRON® PLUS es un Bioestimulante diseñado para ayudar a los cultivos a superar condiciones de estrés y estimular su crecimiento vegetativo. Además, su aporte de macro y micronutrientes suplementa al programa normal de fertilización</p>

INSTRUCCIONES DE USO		
CULTIVOS	DOSIS	EPOCA DE APLICACIÓN
Cereales	1 - 2 L/ha	Aplicar con plantas de 10 cm. Repetir si es necesario, cada 21 días. Dosis de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo.
Hortalizas de hoja y crucíferas- brócoli, repollo, coliflor	2 L/ha	Dos semanas después del trasplante. Repetir cada 21 días, 2 a 3 veces.
Hortalizas de fruto	2 a 3 L/ha	Durante la etapa de desarrollo vegetativo, 2 a 3 aplicaciones cada 15 días. Dosis de acuerdo al estado de desarrollo del cultivo.
Frutales, mango aguacate	300 – 500 cc/hL ó 3 – 5 L/ha	Desde inicio de brotación. Repetir 1 a 2 veces cada 10 a 15 días.
Leguminosas arvejas	2 L/ha	Un mes después de la siembra. Repetir a los 21 días.

Papas	3 L/ha	Aplicar con plantas de 30 cm de altura. Repetir cada 21 días, 2 a 3 veces.
Cultivos en general y plantaciones nuevas (vides, frutales y forestales)	5 – 10 cc/L	Durante las etapas iniciales del cultivo, cada 15 a 20 días.
Praderas	2 L/ha	Aplicar en pradera después del pastoreo, con un rezago de 7 días para que haya suficiente follaje que absorba la aplicación. Majamiento 100-200 L/ha.

APLICACIÓN

FOLTRON® PLUS se aplica por aspersión. Aplique con equipos terrestres o aéreos a la dosis que se indican en el cuadro de Instrucciones de uso.

PREPARACION DE LA MEZCLA

Agite el producto antes de abrir y mezcle con suficiente agua para lograr un buen cubrimiento del follaje.

INCOMPATIBILIDAD

FOLTRON® PLUS es compatible con insecticidas y fungicidas agrícolas, pudiendo aplicarse conjuntamente. Si tiene dudas, realizar una pequeña prueba de compatibilidad previamente y/o consulte a nuestro Departamento Técnico.

Teléfono 506 4404 1430
 Servicio al cliente@upl-ltd.com
 Condominio Industrial Flexipac
 San Rafael, Heredia, Costa Rica.

®Marca Registrada

Setiembre 2020