

ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS

TIPO DE AGROINSUMO: Fertilizante

NOMBRE COMERCIAL: POLIQUEL® CALCIO

FORMULACION: Líquido.	pH DE LA FORMULACIÓN: 3 a 4 (dilución al 10%)	COLOR: Café	SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble
------------------------------	---	-----------------------	--

COMPOSICIÓN PORCENTUAL: % EN PESO

Calcio	10.0
Magnesio.....	1.0
Boro	0.5
Molibdeno.....	10 ppm

PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:

Nutrientes primarios

FAMILIA QUÍMICA:

No aplica

FORMULA QUÍMICA:

No aplica

MODO DE ACCIÓN: Poliquel® Calcio es una formulación de micronutrientes acoplados por agentes orgánicos naturales, que le dan estabilidad al producto en condiciones extremas. Este complejo facilita la penetración y liberación de los nutrientes en la planta. Es un fertilizante de alta solubilidad enriquecido con concentraciones balanceadas de Magnesio, Boro y Molibdeno. Con esta combinación se previenen desordenes fisiológicos en frutos en postcosecha tales como: manchas, pudriciones apicales, deformaciones, además de mejorar las estructuras de las membranas y paredes celulares de frutos, hojas y raíces. Poliquel® Calcio se aplica por aspersión al follaje o disuelto en el agua de riego por goteo.

CATEGORÍA DE PELIGRO:

No aplica

RESIDUALIDAD:

No es Residual.

NÚMERO DE REGISTRO:

RSCO-3127/XII/94

USOS AUTORIZADOS:

Cultivos	Dosis L/ha	Recomendaciones
Acelga, espinaca y lechuga	2 a 3	Aplique en plantas con 4 a 6 pares de hojas y repita cada 10 días según la necesidad de las plantas.
Alfalfa	2 a 3	Aplique al inicio de la floración y repita 4 a 6 veces.
Algodonero	2 a 3	Desde el cuadro y repita cada 15 días según necesidades del cultivo.
Apio	2 a 3	Aplique 30 días después del trasplante y cada 21 días hasta cosecha.
Brócoli, col de Bruselas y coliflor	2 a 3	Aplique al inicio de la formación de la inflorescencia y repita cada semana por dos ocasiones más.
Caducifolio y perennifolios en general	2 a 3	Aplique al inicio de floración y repita al inicio de desarrollo del fruto y luego cada 15 a 21 días.
Calabaza, melón, pepino y sandía	2 a 3	Aplique al inicio la floración, repita en frutos pequeños y 15 días después.
Cereales y granos	2 a 3	Aplique cuando inicia el amacollamiento o de 30 a 50 cm de altura de la planta y repita en estado de grano lechoso.
Chile y jitomate (tomate)	2 a 3	Aplique en prefloración y al inicio del desarrollo de frutillos y luego en cada amarre de frutos (15 a 21 días después).
Fresa	3 a 4	Aplique hasta 15 días después del trasplante, al inicio de floración y repita cada 15 días.
Manzano	4 a 5	Aplique a partir de la caída de pétalos y repita a intervalos de 15 días, hasta un máximo de 5 aplicaciones.
Vid	2 a 3	Aplique cuando los brotes tengan de 4 a 6 hojas y repita según se requiera.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS:

Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

Envase de 1 L
Garrafa de 20 L

RESPONSABLE DEL PRODUCTO:

Arysta LifeScience México, S.A. de C.V.
Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369
Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México.
Tel. 01 844 438 05 00.