



ESPECIFICACIONES DE AGROINSUMOS

TIPO DE AGROINSUMO: Fertilizante foliar inorgánico

NOMBRE COMERCIAL: POLIQUEL® FIERRO

FORMULACIÓN: Líquido	pH DE LA FORMULACIÓN: 2 a 3	COLOR: Café oscuro	SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble
COMPOSICIÓN PORCENTUAL:		PRINCIPALES COMPUESTOS DE LA FORMULACIÓN:	
% EN PESO		Nutrientes primarios	
Fierro (Fe).....	8.0	FAMILIA QUIMICA: No aplica	
		FORMULA QUIMICA: No aplica	

MODO DE ACCIÓN: POLIQUEL® FIERRO es una formulación de Hierro acompañado por agentes orgánicos naturales, que le dan estabilidad al producto en condiciones extremas. Este complejo facilita la penetración y liberación de los nutrientes en la planta. Es un fertilizante de alta solubilidad de Hierro. Con esta formulación se realiza el aporte de Hierro, el cual juega un papel importante en la transferencia de electrones, forma parte de proteínas y de más de 130 enzimas que catalizan reacciones bioquímicas únicas como la respiración, fotosíntesis, reducción de nitratos y sulfatos. El Hierro tiene tendencia a formar complejos quelatados, característica importante en numerosas funciones fisiológicas.

CATEGORÍA DE PELIGRO: No aplica	RESIDUALIDAD: No es Residual.	NÚMERO DE REGISTRO: RSCO-3122/XII/94
---	---	--

USOS AUTORIZADOS:

Cultivos	Dosis Litro/ha	Recomendaciones
Alfalfa	2 a 3	Cuando el rebrote tenga de 5 y 10 cm de longitud y repita después de cada corte. En cultivos para semilla aplique al inicio de la floración y repita cada 10 a 14 días según se necesite.
Algodonero	2 a 3	Aplique a plantas de 15 a 20 días de emergidas y repita 1 a 2 veces con intervalos de 10 días.
Calabaza, melón, pepino y sandía	2 a 3	Aplique 10 días después del trasplante y repita cada 15 días. Según necesidades del cultivo. Aplique al iniciar la floración, repita en frutos pequeños y 15 días después.
Cereales y granos	2 a 3	Aplique 10 días después de emergencia y repita en granos lechosos.
Cítricos	2 a 3	Aplique al crecimiento de nuevos brotes y repita en floración.
Chile y jitomate (tomate)	2 a 3	Aplique a los 15 días del trasplante, en pre-floración, al inicio del desarrollo de frutillos y repita cada 15 a 21 días.
Fresa	2 a 3	Aplique después del trasplante, repita antes del inicio de la floración y después de cada corte.
Frutales caducifolios y perennifolios en general	2 a 3	Aplique al crecimiento de nuevos brotes, al inicio de floración y en crecimiento de frutos.
Manzano y peral	4 a 5	
Papa	2 a 3	Aplique cuando las plantas tengan entre 10 y 30 cm de altura y repita cada 21 a 28 días según se requiera.
Vid	2 a 3	Aplique cuando los brotes tengan de 4 a 6 hojas repita según se requiera.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS: Lea detenidamente la etiqueta del producto y siga las indicaciones de uso.	PRESENTACIONES COMERCIALES: Envase de 1 L Garrafa de 20 L	RESPONSABLE DEL PRODUCTO: Arysta LifeScience México, S.A. de C.V. Blvd. Jesús Valdés Sánchez No. 2369 Col. Europa, C.P. 25290. Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México. Tel. 01 844 438 05 00.
---	--	--