



UPL LIMITED

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: AFFIX 50 WG

INGREDIENTE ACTIVO: AZOXYSTROBIN.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Granulo dispersable. Contiene 500 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

CLASE: FUNGICIDA.

GRUPO QUÍMICO: ESTROBILURINA

MODO DE ACCIÓN: Fungicida de amplio espectro, con acción sistémico-translaminar, se utiliza de forma preventiva, curativa y anti-esporulante.

MECANISMO DE ACCIÓN: Actúa inhibiendo de la respiración mitocondrial en el hongo, al evitar la transferencia de electrones entre el citocromo b y el citocromo c.

CULTIVOS: Café, arroz, papa, tomate, chile, ajo, cebolla, cucurbitáceas, tabaco, apio, frijol, helecho hoja de cuero, lechuga, crucíferas, rosa, mango, zanahoria.

ENFERMEDADES QUE CONTROLA

Cercospora: *Cercospora coffeicola*

Ojo de Gallo: *Mycena citricolor*

Tizón de la hoja: *Pyricularia oryzae*

Rhizoctonia sp

Escaldado de la hoja: *Rhynchosporium* sp

Mancha marrón: *Helminthosporium oryzae*

Alternariosis *Alternaria* spp.

Tizón tardío: *Phytophthora infestans*

Oidio: *Erysiphe* sp.

Mildiú: *Peronospora* sp.

Roya: *Puccinia allii*

Mildiú veloso: *Pseudoperonospora cubensis*

Fusariosis: *Fusarium* sp

Esclerotinia: *Sclerotinia sclerotiorum*

Septoriosis: *Septoria apii*

Antracnosis: *Colletotrichum* sp

Roya: *Uromyces phaseoli*

Mildiú: *Bremia lactucae*

Mildiú polvoso: *Sphaerotheca pannosa*

Odiosis: *Oidium mangiferae*

DOSIS: 150- 750 g/há, según el cultivo

COMPATIBILIDAD: Incompatible con algunos coadyuvantes y con insecticidas foliares de formulados como concentrados emulsionables

CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA: Categoría III, ligeramente peligroso. Banda Azul